

Chapitre 21 Compléments sur l'intégrationI - Primitive d'une fonction continue sur un intervalle

- 1) Définition et premières propriétés
- 2) Existence de primitives et premiers exemples

II - Intégrale d'une fonction continue sur un segment

- 1) Définition, lien avec la notion de primitive
- 2) Propriétés fondamentales de l'intégrale
- 3) Interprétation géométrique de la notion d'intégrale pour une fonction continue
- 4) Théorème de la valeur moyenne, sommes de Riemann

III - Méthodes de calcul intégral

- 1) Intégration de fonctions rationnelles
 - a) Intégration des fonctions du type $t \mapsto (t - a)^n$ ($n \in \mathbb{Z}$)
 - b) Intégration des fonctions du type $f : t \mapsto \frac{at+b}{t^2+pt+q}$ (seulement le cas où $p^2 - 4q \geq 0$).
- 2) Intégration par parties
- 3) Changement de variable

IV - Extension de la notion d'intégrale

Intégrale d'une fonction continue par morceaux.

V - Equations autonomes du type $y' = g(y)$

Éléments de résolution de ces équations. Cas de l'équation de Verhulst et de l'équation de Gompertz.

Exemples de compétences attendues

- ❶ Connaître les propriétés usuelles de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment.
- ❷ Savoir étudier une fonction définie par une intégrale fonction de ses bornes.
- ❸ Savoir utiliser et rédiger une intégration par parties.
- ❹ Savoir reconnaître et calculer une somme de Riemann.
- ❺ Savoir effectuer un changement de variable.
- ❻ Savoir calculer une primitive d'une fonction de la forme $x \mapsto \frac{ax+b}{x^2+px+q}$ avec $a, b, p, q \in \mathbb{R}$ dans le cas où le dénominateur n'a que des racines **réelles** (décomposition en éléments simples).
- ❼ Connaître (et savoir mener) la méthode de résolution d'équations autonomes simples.

Questions de cours possibles :

- Énoncer **correctement** et démontrer la formule d'intégration par partie.
Énoncer **correctement** et démontrer la formule de changement de variable.
- Énoncer **correctement** les formules sur les sommes de Riemann (cas où on travaille sur le segment $[0, 1]$) et application à un calcul simple de limite d'une somme de Riemann quand le pas tend vers 0.

Chapitre 22 Espaces probabilisés finis**I - Dénombrement****1) Définitions et généralités**

Ensembles équipotents, ensembles finis, cardinal d'un ensemble fini.

Cardinal d'une réunion finie d'ensembles finis deux à deux disjoints.

Cardinal d'une réunion de deux ensembles finis.

Cardinal d'un produit cartésien fini d'ensembles finis.

2) Dénombrements usuels**II - Espaces probabilisés finis****1) Univers et événements****2) Notion de probabilité****III - Probabilité conditionnelle et théorèmes principaux****1) Définition****2) La formule des probabilités composées****3) La formule des probabilités totales****4) La formule de Bayes****5) Indépendance**

Annexe : Quelques outils pour effectuer des simulations aléatoires avec Python

Exemples de compétences attendues

- ❶ Savoir calculer le cardinal d'une réunion disjointe (ou d'une réunion quelconque de deux ensembles).
- ❷ Savoir comment et quand utiliser le passage par dénombrement du complémentaire.
- ❸ Savoir utiliser la technique du "découpage" en petits ensembles plus faciles à dénombrer.
- ❹ Savoir modéliser les situations combinatoires à l'aide d'un vocabulaire précis.
- ❺ Connaître et utiliser les dénombrements usuels (nombre de parties d'un ensemble, nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments, nombre de p -listes avec ou sans répétition. . .).
- ❻ Dans des cas simples, savoir modéliser et dénombrer l'univers Ω d'une expérience aléatoire.
- ❼ Connaître et savoir utiliser les propriétés d'une probabilité.
- ❽ Savoir calculer des probabilités d'événements à l'aide de la probabilité uniforme.

Questions de cours possibles :

- ❶ Énoncer les propriétés du cardinal d'un ensemble fini (cardinal d'une réunion finie d'ensembles finis deux à deux disjoints, cardinal d'une réunion de deux ensembles finis).

Donner les formules pour les dénombrements usuels (nombre de parties d'un ensemble fini, nombre de parties de cardinal k d'un ensemble fini, nombre de p -listes (avec ou sans répétition) d'un ensemble fini E).

- ❷ Donner la définition et les propriétés d'une probabilité sur un univers fini (*cf* propriétés ci-dessous).

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. Alors :

- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, A \subset B \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
- $P(\emptyset) = 0$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), 0 \leq P(A) \leq 1$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et A_1, A_2, \dots, A_n sont des événements deux à deux incompatibles, alors $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et (A_1, A_2, \dots, A_n) est un sce, alors $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

- ❸ Démontrer les propriétés ci-dessous :

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. Alors :

- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, A \subset B \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
- $P(\emptyset) = 0$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), 0 \leq P(A) \leq 1$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega)^2, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$